



図版 グループ E



キハダ

長さ5~10cmの小葉が
5~13. みかんの匂い。




ヤチダモ

小葉は7~11枚
オニグルミはより大型で葉の表面に
毛がある



エゾニワトコ


低木。白い花をつけ赤い実がなる。



アオダモ


やや湿った斜面に生える
樹皮は滑らか

図版 グループ F



ニセアカシア

北アメリカ原産の帰化種
白い房状の花は甘い香りが強い




エゾヤマハギ

明るい斜面に生える低木
紅紫色の花をつける



タラノキ

葉にもとげを持つ 芽を食用




クロイチゴ

バラ科の低木 実が食用



イヌエンジュ


芽吹きは遅く
若葉は銀白色



ナナカマド

初夏に白い花、赤い実がなる

図版 F-2



ホザキナナカマド


道端にみられる低木
白い花をつける



ニガキ


林内に見られる亜高木
葉をかじると苦い

図版 G



コシアブラ

エダにとげがある
葉の径は10~20cm



ケヤマウコギ

葉の径は4~10cm


図版 つる性植物



ツタウルシ
明るい林床に多い
かぶれるので注意




イワガラミ
白いがく片は1個




ゴトウヅル
白いがく片は3個




コクワ
葉に光沢がありやや肉厚
葉柄は普通赤い



ミヤママタタビ
葉はときに白くなり
赤みも帯びる 基部は心形




ヤマブドウ
葉は10~25cmと大きい
秋に紅葉



ツルウメモドキ
赤い実がなる 秋に黄葉

ほふく性植物



フッキソウ
早春に白い花をつける